

อังกาบหนู



ชื่อไทย : อังกาบหนู

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Barleria prionitis* L.

สกุล : *Barleria*

ชื่อพ้อง : *Barleria appressa* (Forssk.) Defflers *Barleria coriacea* Oberm.

Barleria prionitis subsp. *prionitis*

ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

-ลำต้น สูงถึง ๑.๘ ม. ลำต้นตั้งตรง

-ใบ ใบรูปรีถึงรูปไข่ กว้าง ๑.๘-๕.๕ ซม. ยาว ๔.๐-๑๐.๕ ซม. โคนใบสอบเรียว และเป็นครีป ปลายแหลม

-ดอก ดอกเป็นกลุ่มที่ปลายยอด กลีบดอกสีเหลืองถึงสีส้ม ดอกขนาด ๒.๔-๔.๐ ซม. โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นแฉก เกสรเพศผู้ ๔ อัน

-ผล ผลแตกเมื่อแห้ง รูปไข่ ขนาดประมาณ ๑.๘ ซม.

-เมล็ด รูปไข่ กว้าง ๕ มม. ยาว ๗ มม.

สภาพนิเวศ : กลางแจ้ง, ริมรั้ว

สภาพนิเวศวิทยา : พบตามป่าดิบ ในที่รกร้าง ที่ระดับความสูงต่ำ บางครั้งกลายเป็นวัชพืช ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ๒๐๐ เมตร

ถิ่นกำเนิด : มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย ศรีลังกา และภาคตะวันออกเฉียงและภาคใต้และแอฟริกากลาง

การกระจายพันธุ์ : อินเดีย ลาว พม่า ศรีลังกา ไทย เวียดนาม แอฟริกา

การปลูกและการขยายพันธุ์ : ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง

ระยะเวลาการติดดอก : ตุลาคม-ธันวาคม

ระยะเวลาการติดผล : ธันวาคม-กุมภาพันธ์

ประเภทการใช้ประโยชน์

สมุนไพร, พืชประดับ

ใบมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ ยาขับปัสสาวะ และยาชูกำลัง ใบเคี้ยวในการรักษาไข้, โรคไขข้อ, โรคตับท้องอืดท้องผูก, ท้องผูก, โรคผิวหนังและการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ ใบจะใช้ภายนอกเพื่อส่งเสริมการรักษาบาดแผลและเพื่อบรรเทาอาการปวดข้อและอาการปวดฟัน

อ้างอิง : ฐานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี