

แบบประเมินการใช้ยาที่เหมาะสม (DUE) โรงพยาบาลควนเนียง

Atorvastatin 40 mg

ผู้ป่วยชื่อ _____ อายุ _____
HN _____ วันที่ส่งจ่าย _____

ข้อบ่งชี้ใช้ (ขอความร่วมมือ : ระบุข้อบ่งชี้ทุกครั้ง)

- Stroke
- Myocardial infarction (MI)
- ใช้ Simvastatin แล้วมีค่า AST, ALT เพิ่มขึ้น 3 เท่า ของค่าสูงสุดของค่าปกติ
- ใช้ Simvastatin แล้วเกิดอาการข้างเคียง
- ใช้ Simvastatin เกิน 20 mg คู่กับ Amlodipine 10 mg และเสี่ยงต่อการเกิด myopathy หรือ rhabdomyolysis
- รับยาเดิมจากสถานพยาบาลอื่น

จัดอยู่ในกลุ่มยา : Statin (บัญญัติ ข)

กลไกการออกฤทธิ์ : HMG CoA Reductase Inhibitors

ขนาดยาที่ใช้ในการรักษา : 10-80 mg วันละครั้ง (เวลาใดก็ได้ แต่ควรกินยาเวลาเดียวกันทุกวัน)

อาการข้างเคียง:

- กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปวดเมื่อยผิดปกติ บ๊วบวบเป็นสีแดงหรือสีเข้มผิดปกติ หรืออาจทำให้เกิดตับอักเสบ มี

อาการเบื่ออาหาร ตัวเหลือง ตาเหลือง

- ท้องเสีย ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อ

ข้อห้ามใช้

- แพ้ยาหรือส่วนประกอบของยานี้, หญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตร

Drug interaction :

- ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับ Ritonavir หรือ Posaconazole เพราะอาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง
- หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับ Gemfibrozil เพราะอาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง

แพทย์ผู้สั่งใช้.....

การประเมินผล (เภสัชกร)

- ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์