

แบบประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสม (DUE) โรงพยาบาลควนเนียง

Avamys® Nasal Spray

(Fluticasone furoate 50 µl)

ผู้ป่วยชื่อ _____ อายุ _____

HN _____ วันที่ส่งจ่าย _____

ข้อบ่งชี้ (ขอความร่วมมือ : ระบุข้อบ่งชี้ทุกครั้ง)

- ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการคันตา ร่วมกับอาการทางจมูกข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (ระดับ moderate)
 - คันจมูก/จาม 5-10 ครั้ง/วัน คันจมูกติดต่อกันนานกว่า 30 นาที
 - น้ำมูกไหล สูด/เช็ด 5-10 ครั้ง/วัน
 - คัดแน่นจมูกจนหายใจทางปาก
 - น้ำมูกลงคอ กระแอมบ่อย รำคาญ
 - ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการคันตา ร่วมกับอาการทางจมูกข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ (ระดับ severe)
 - คันจมูก/จาม มาก มีผลต่อการนอนหลับและสมาธิ
 - น้ำมูกไหลเป็นน้ำ เช็ดบ่อยครั้ง
 - คัดแน่นจมูกจนไม่สามารถหายใจทางจมูกได้เลย
 - น้ำมูกลงคอ ไอหรือจับเสมหะบ่อย ไม่สบายคอ
- เสียงขึ้นจมูก มีปัญหาการได้รับกลิ่น

Asthma uncontrolled ยาเดิมเพิ่มขนาดยาพ่นจนถึง max dose แล้ว ลอง treat AR ร่วมด้วย

ประกอบด้วย

1. Fluticasone furoate 50 µl (pregnancy category : C) ปริจจุ 120 dose

วิธีการบริหาร :

- เด็ก (อายุ 2-11 ปี)
 - ขนาดเริ่มต้นที่แนะนำ : พ่นจมูกข้างละ 1 ที วันละครั้ง (55 mcg/วัน) ก่อนนอน
 - หากไม่ได้ผล : พ่นจมูกข้างละ 2 ที วันละครั้ง (110 mcg/วัน) ก่อนนอน และเมื่อควบคุมอาการได้แล้วลดเหลือ พ่นจมูกข้างละ 1 ที วันละครั้ง ก่อนนอน
- ผู้ใหญ่หรือเด็กอายุ 12 ปี ขึ้นไป
 - ขนาดเริ่มต้นที่แนะนำ : พ่นจมูกข้างละ 2 ที วันละครั้ง (110 mcg/วัน) ก่อนนอน
 - เมื่อคุมอาการได้ : พ่นจมูกข้างละ 1 ที วันละครั้ง (55 mcg/วัน) ก่อนนอน

ข้อควรระวัง: ระวังการใส่ยาในผู้ป่วยโรคตับขั้นรุนแรง

อาการไม่พึงประสงค์ : พบบ่อย: เลือดกำเดาไหล เกิดแผลในจมูก ปวดศีรษะ

พบน้อย: Anaphylaxis Angioedema Rash และ Urticaria

ปฏิกิริยาระหว่างยา :

- Ritonavir จะทำให้ปริมาณ Fluticasone ในเลือดเพิ่มขึ้น
- Ketoconazole และ Itraconazole จะทำให้ปริมาณ Fluticasone ในเลือดเพิ่มขึ้น

แพทย์ผู้สั่งใช้.....

การประเมินผล (เภสัชกร)

ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์