

แบบประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสม (DUE) โรงพยาบาลควนเนียง

**AZITHROMYCIN 250 mg (บัญชี่ ง)**

ผู้ป่วยชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_

HN \_\_\_\_\_ วันที่สั่งจ่าย \_\_\_\_\_

ข้อบ่งชี้ใช้ (ขอความร่วมมือ : ระบุข้อบ่งชี้ทุกครั้ง)

\*\*\* เพื่อป้องกันการติดเชื้อ **Mycobacterium avium complex (MAC) infection**

ในผู้ป่วย ARV ผู้ใหญ่ ที่มีระดับ CD4 < 50 cells/mm<sup>3</sup> และต้องไม่มีลักษณะทางคลินิกบ่งชี้หรือสงสัยว่าจะมีการติดเชื้อนี้

**ขนาดยา** สำหรับป้องกัน 1,000–1,250 mg กินสัปดาห์ละครั้ง (4-5 tab/week)

**การหยุดให้ยาป้องกัน (Primary prophylaxis)** ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสจนระดับ CD4 ≥ 100 cells/mm<sup>3</sup> นานกว่า 3 เดือน สามารถหยุดยาป้องกันได้ และถ้าระดับ CD4 ลดลงต่ำกว่า 50 cells/mm<sup>3</sup> แนะนำให้เริ่มยาป้องกันใหม่

เนื่องด้วยอุบัติการณ์ของ MAC ในผู้ป่วยเอดส์ลดลงมากเมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส นอกจากนี้การให้ยาป้องกัน โรคนี้ในผู้ป่วยเอดส์อาจก่อให้เกิดปัญหาเชื้อ MAC คือต่อยาที่ใช้ในการป้องกันซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในการรักษาผู้ป่วยตามมา ดังนั้น จึงอาจพิจารณาให้ Primary prophylaxis สำหรับ MAC หรือไม่ได้ถ้าสามารถเริ่มการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้เร็ว และมีข้อจำกัดในการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้ออยู่แล้วหรือไม่

\*\*\* **โรคหนองในเทียมทั้งผู้ป่วยทั่วไปและหญิงตั้งครรภ์**

**ขนาดยา** 1,000 mg กินครั้งเดียว ก่อนอาหาร 1 ชั่วโมง

แพทย์ผู้สั่งใช้ .....

การประเมินผล (เก็ลชกร)

ตามเกณฑ์  ไม่ตามเกณฑ์