

แบบประเมินการใช้ยาที่เหมาะสม (DUE) โรงพยาบาลควนเนียง

Berodual[®] MDI

(Ipratropium bromide + Fenoterol hydrobromide Evohaler)

ผู้ป่วยชื่อ _____ อายุ _____

HN _____ วันที่ส่งจ่าย _____

ข้อบ่งชี้ (ขอความร่วมมือ : ระบุข้อบ่งชี้ทุกครั้ง)

- บรรเทาอาการเฉียบพลันที่เกิดจากโรค COPD
- บรรเทาอาการเฉียบพลันในผู้ป่วยที่ทน side effect ของ Ventolin ไม่ได้
- รับยาต่อเนื่องมาจากที่อื่น (refer back)

ประกอบด้วย Ipratropium bromide 20 mcg + Fenoterol hydrobromide 50 mcg (pregnancy category : C)

ขนาดบรรจุ บรรจุขวดละ 200 doses

วิธีการบริหาร :

- ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุมากกว่า 6 ปี
 - สูดยาครั้งละ 1-2 สูด เมื่อมีอาการ (ไม่เกิน 8 สูด/วัน)

ข้อควรระวัง

- ระวังภาวะหัวใจเต้นเร็วในผู้ป่วยต่อหิมนชนิดมมแคบ ต่อมลูกหมากโต หรือมีการอุดตันที่คอกระเพาะปัสสาวะ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ได้รับยา anticholinergic โดยวิธีอื่นร่วมด้วย
- ระวังภาวะหัวใจเต้นเร็วในผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมเบาหวานได้ดีพอ ผู้ป่วยที่เคยเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย มีอาการผิดปกติทางหัวใจ และหลอดเลือดอย่างรุนแรง ผู้ป่วยโรคต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป ผู้ป่วยเนื้องอก pheochrome

ข้อห้ามใช้

- ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่แพ้ยานี้ หรือยาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับยา atropine หรือส่วนประกอบอื่นในยา
- ห้ามใช้ในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจโตชนิดอุดตัน และหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ

อาการไม่พึงประสงค์ : ใจสั่น ไอ ปากแห้ง คอแห้ง ปวดศีรษะ มือและเท้าสั่น คลื่นไส้ เวียนศีรษะ

หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ มีผลต่อดวงตา (ปรับสายตาดูได้ยาก แสบตา ปวดตา มองไม่ชัดชั่วคราว)

แพทย์ผู้สั่งใช้.....

การประเมินผล(เภสัชกร)

- ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์