

แบบประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสม (DUE) โรงพยาบาลควนเนียง

Carvedilol 6.25 mg (Dilatrend ®)

ผู้ป่วยชื่อ _____ อายุ _____

HN _____ วันที่สั่งจ่าย _____

ข้อบ่งชี้ใช้ (ขอความร่วมมือ : ระบุข้อบ่งชี้ทุกครั้ง)

- CHF
- รับยาเดิมจากสถานพยาบาลอื่น

จัดอยู่ในกลุ่มยา : ยา ED บัญชี ค.

กลไกการออกฤทธิ์ : Nonselective beta-adrenergic blocker with alpha-1 blocking activity

ขนาดยาที่ใช้ในการรักษา

- Hypertension : 6.25 mg PO bid ; maintain for 7-14 days แล้วปรับขนาดยาเพิ่มเป็น 12.5 mg PO bid ถ้าหากมีความจำเป็นต้องควบคุมความดันโลหิต ไม่ควรให้ยา Carvedilol เกิน 50 mg ต่อวัน
- CHF (congestive heart failure) ขนาดยาเริ่มต้น คือ 3.125 mg PO bid เป็นเวลา 2 สัปดาห์ แล้วอาจปรับขนาดยาเพิ่มถึง 6.25 mg PO bid ขนาดยาอาจจะปรับเป็นสองเท่า (doubled) ทุก 2 สัปดาห์

Maximum Dose : 25 mg PO bid ในผู้ป่วยที่มี BW <85 kg , 50 mg PO bid ในผู้ป่วยที่มี BW >85 kg

อาการข้างเคียง :

- CNS: Dizziness, Vertigo, Tinnitus, Fatigue, Emotional depression, Paresthesias, Sleep disturbances
- GI: Gastric pain, Flatulence, Constipation, Diarrhea, Hepatic failure
- CVD: Bradycardia, Orthostatic hypertension, CHF, Cardiac arrhythmias, Pulmonary edema, Hypotension
- URI: Rhinitis, Pharyngitis, Dyspnea

ข้อห้ามใช้/ข้อควรระวัง :

- ห้ามใช้ในผู้ป่วย: Decompensated CHF, Bronchial asthma, Heart block, Hypersensitivity to carvedilol, Pregnancy, Lactation
- ใช้อย่างระวังในผู้ป่วย: Hepatic impairment, Peripheral vascular disease, Thyrotoxicosis, Diabetes

แพทย์ผู้สั่งใช้.....

การประเมินผล (เกณฑ์)

- ตามเกณฑ์
- ไม่ตามเกณฑ์