

แบบประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสม (DUE) โรงพยาบาลควนเนียง

Nifedipine SR 20 mg

ผู้ป่วยชื่อ _____ อายุ _____

HN _____ วันที่ส่งจ่าย _____

ข้อบ่งชี้ (ขอความร่วมมือ : ระบุข้อบ่งชี้ทุกครั้ง)

Tocolytic drugs for Preterm labor (ในอายุครรภ์ 24-33 สัปดาห์)

กลุ่มยา: Calcium Chanel Blocker

ขนาดยาที่ใช้ในการรักษา:

- ขนาดยาเริ่มต้น: 20 mg รับประทานทันที

- หากมดลูกยังหดตัว หลังให้ยาแล้ว 30 นาที: ให้อีก 20 mg รับประทาน ทุก 30 นาที หากจำเป็นให้ได้จำนวน 2 ครั้ง

- หากมดลูกไม่มีการหดตัวแล้ว: ให้ maintenance dose 20-40 mg ทุก 6-8 ชั่วโมง โดยขนาดยาสูงสุดไม่เกิน 160 mg/24 ชั่วโมง การพิจารณาหยุดให้ยากับอายุครรภ์ การได้รับยา corticosteroid เพื่อกระตุ้นปอดทารก และ ศักยภาพของโรงพยาบาล

- ขนาดยาสูงสุดที่ให้: 160 mg/24 ชั่วโมง

อาการข้างเคียง: ความดันโลหิตต่ำ, ใจเต้น, หน้ามืด, ปวดศีรษะ และ คลื่นไส้อาเจียน

ข้อควรระวัง: หักได้แต่ห้ามบด

แพทย์ผู้สั่งใช้.....

การประเมินผล (เภสัชกร)

ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์