

แบบประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสม (DUE) โรงพยาบาลควนเนียง

Progesterone 100 mg

ผู้ป่วยชื่อ _____ อายุ _____

HN _____ วันที่ส่งจ่าย _____

ข้อบ่งชี้ (ขอความร่วมมือ : ระบุข้อบ่งชี้ทุกครั้ง)

- ป้องกัน Preterm birth ในหญิงตั้งครรภ์เดี่ยว
 - มีประวัติคลอดก่อนกำหนด (หลัง 16 Week เป็นต้นไป)
 - มี Short cervical length (transvaginal) น้อยกว่า 25 mm

ขนาดยาที่ใช้ในการรักษา: 100-200 mg สอดช่องคลอดทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน

อาการข้างเคียง:

ง่วง เมื่อย ปวดศีรษะ คัน แสบบริเวณช่องคลอด

ข้อห้ามใช้

- ห้ามในผู้ที่แพ้ยาหรือสารประกอบในยานี้
- ห้ามใช้โดยวิธีการรับประทานในรายที่เป็น โรคตับ thromboembolic disorder, มีเลือดออกในสมอง

แพทย์ผู้สั่งใช้.....

การประเมินผล (เภสัชกร)

ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์