

แบบประเมินการใช้ยาที่เหมาะสม (DUE) โรงพยาบาลควนเนียง

Symbicort® Turbuhaler

(Budesonide 160 mcg + Formoterol 4.5 mcg)

ผู้ป่วยชื่อ _____ อายุ _____
HN _____ วันที่ส่งจ่าย _____

ข้อบ่งชี้(ขอความร่วมมือ : ระบุข้อบ่งชี้ทุกครั้ง)

- ผู้ป่วย Asthma ที่ใช้ยา Budesonide MDI ขนาดปานกลาง (2 puff bid) และ Seroflo® (25/125) ขนาดปานกลาง (2 puff bid) แล้ว แต่ยังไม่สามารถควบคุมอาการได้
- ผู้ป่วย COPD ที่ใช้ยา Seroflo® (25/125) ขนาดปานกลาง (2 puff bid) แล้ว แต่ยังไม่สามารถควบคุมอาการได้และมีประวัติ ≥ 2 moderate Exacerbation หรือ ≥ 1 hospitalization ร่วมกับมี mMRC ≥ 2 , CAT ≥ 10
- รับยาต่อเนื่องมาจากที่อื่น (Refer back)

ประกอบด้วย

1. Budesonide (Inhaler corticosteroid : ICS) 160 mcg (pregnancy category : C)
2. Formoterol Fumarate (long acting Beta₂- agonist : LABA) 4.5 mcg (pregnancy category : C)

ขนาดบรรจุ บรรจุขวดละ 120 doses

วิธีการบริหาร : สูดเข้าทางปาก

ผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

- Asthma สูดยาครั้งละ 1-2 สูด วันละ 2 ครั้ง เข้า-เย็น
- COPD สูดยาครั้งละ 2 สูด วันละ 2 ครั้ง เข้า-เย็น

ข้อควรระวัง

1. ไม่ควรเริ่มต้นการรักษาด้วยยา symbicort® ในขณะที่ผู้ป่วยมีอาการกำเริบของโรค เพราะอาจทำให้เกิดผลตรงข้ามคือเกิดหลอดลมหดเกร็งได้เช่นเดียวกับการรักษาด้วยยาสูดพ่นชนิดอื่น โดยผู้ป่วยจะหายใจมีเสียงหวีด
2. ควรระวังเมื่อให้ในผู้ป่วยที่เป็นวัณโรคที่ปอด (pulmonary tuberculosis)
3. อาจทำให้ serum potassium ลดลงชั่วคราวได้ถ้าใช้ในขนาดที่สูง

ปฏิกิริยาระหว่างยา

Ketoconazole และ Itraconazole หรือยาในกลุ่มที่มีฤทธิ์ยับยั้ง CYP3A4 จะทำให้ปริมาณ symbicort® ในเลือดเพิ่มขึ้น
อาการไม่พึงประสงค์ : ปวดศีรษะ เสียงแหบ ดิดเชื้อราในช่องปาก คลื่นไส้ อาเจียน

แพทย์ผู้สั่งใช้.....

การประเมินผล(เกณฑ์)

- ตามเกณฑ์
- ไม่ตามเกณฑ์