

แบบประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสม (DUE) โรงพยาบาลควนเนียง

Vitamin D₂ 20000 Unit (500 mcg/cap)

(Ergocalciferol 20,000 unit)

ผู้ป่วยชื่อ _____ อายุ _____

HN _____ วันที่ส่งจ่าย _____

ข้อบ่งชี้ (ขอความร่วมมือ : ระบุข้อบ่งชี้ทุกครั้ง)

ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงกระดูกพรุน (FRAX positive)

ขนาดยาที่ใช้ในการรักษา: 1 cap/week

อาการข้างเคียง: Hypercalcemia, Hyperphosphatemia

ปฏิกิริยาระหว่างยา:

- ยาที่ลดฤทธิ์ Vit D₂: Isoniazid, phenytoin, Rifampin
- ยาที่รับประทานร่วมกับ Vit D₂ แล้วทำให้ระดับ Calcium ในเลือดสูงขึ้น: HCTZ, Digoxin,
- ยาที่รับประทานร่วมกับ Vit D₂ แล้วทำให้ระดับ magnesium ในเลือดสูงขึ้น: Antacid

ข้อห้ามใช้: Hypercalcemia, Malabsorption syndrome, Abnormal sensitivity to the toxic effects of vitamin D, and hypervitaminosis D

แพทย์ผู้สั่งใช้.....

การประเมินผล (เกณฑ์)

ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์