

แบบประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสม (DUE) โรงพยาบาลควนเนียง

น้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา)

ผู้ป่วยชื่อ _____ อายุ _____
HN _____ วันที่ส่งจ่าย _____

ข้อบ่งชี้ (ขอความร่วมมือ : ระบุข้อบ่งชี้ทุกครั้ง)

- นอนไม่หลับ
- ไมเกรน
- มะเร็ง
- พาร์กินสัน

รูปแบบยา: ยาน้ำมัน

ขนาดและวิธีใช้

รับประทานขนาด 1 หยด ทางปาก แล้วปรับขนาดใช้ตามคำสั่งของแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน

ข้อห้ามใช้

- ห้ามใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดกัญชาซึ่งอาจเกิดจากส่วนประกอบอื่นๆ (ในผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าว)
- ห้ามใช้กัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC ในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดขั้นรุนแรง หรือไม่สามารถคุมอาการได้ รวมถึงห้ามใช้ในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ
- ห้ามใช้กัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC เหนือ ในผู้ป่วยที่มีประวัติความผิดปกติทางจิตเวช หรือมีประวัติครอบครัวเป็นโรคจิตเภท
- ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ สตรีที่ให้นมบุตร รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ ที่มีได้คุมกำเนิดหรือสตรีที่วางแผนจะตั้งครรภ์

คำเตือนและข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้กัญชา
- อาจทำให้ง่วงซึมจึงไม่ควรขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล หรือทำงานที่เสี่ยงอันตราย
- ไม่ควรใช้กัญชาที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ THC เหนือ ในบุคคลที่อายุต่ำกว่า 25 ปี ยกเว้นในกรณีที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าผู้ป่วยได้รับประโยชน์มากกว่าเสี่ยง
- อาจทำให้หัวใจเต้นเร็ว ใจสั่น ความดันโลหิตสูง มีน้ิรยะ คลื่นไส้ อาเจียน กระวนกระวาย ซึม

- ไม่ควรใช้กัญชาในผู้ป่วยที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือหลอดเลือดสมองที่รุนแรง เนื่องจากอาจทำให้ความดันเลือดต่ำ บางครั้งอาจทำให้ความดันเลือดสูง เป็นลมหมดสติ หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ กล้ามเนื้อหัวใจตาย และโรคหลอดเลือดสมอง
- ไม่ควรใช้กัญชาในผู้ป่วยที่มีภาวะการทำงานของตับหรือไตบกพร่องรุนแรง
- ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเพราะอาจเกิดการติดยาได้ นอกจากแพทย์สั่ง หากใช้เป็นประจำควรประเมินผลการรักษาเป็นระยะและควรปรึกษาแพทย์ก่อนหยุดใช้ยา เพราะจำเป็นต้องปรับลดขนาดยาลงทีละน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการถอนยา
- ควรใช้กัญชาด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาร่วมกับยากล่อมประสาท หรือยาที่ออกฤทธิ์ทางจิตอื่นๆ
- ควรใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีประวัติของการใช้สารเสพติด รวมถึงผู้มีประวัติติดยา
- หากมีอาการแพ้ยา เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร
- ควรเก็บยาให้พ้นมือเด็ก

การเก็บรักษา: เก็บที่อุณหภูมิต่ำกว่า 30 องศาเซลเซียส และเก็บให้พ้นแสง

ขนาดบรรจุ: ปริมาตรสุทธิ 10 มิลลิลิตร

ผู้สั่งใช้ (นพ.คณาวุฒิ นิธิกุล และแพทย์แผนไทย)

การประเมินผล (เภสัชกร)

ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์