

# แบบประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสม (DUE) โรงพยาบาลควนเนียง

## ยาทำลายพระสุเมรุ

ผู้ป่วยชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_  
HN \_\_\_\_\_ วันที่ส่งจ่าย \_\_\_\_\_

### ข้อบ่งชี้ (ขอความร่วมมือ : ระบุข้อบ่งชี้ทุกครั้ง)

- แก้วลมจุกเสียด
- แก้วเมื่อยขบตามร่างกาย แก้วปวดกล้ามเนื้อ
- คลายกล้ามเนื้อที่แข็งเกร็งจากโรคกล้ามเนื้อ อัมพาต

รูปแบบยา: แคปซูล

ขนาดและวิธีใช้: รับประทานครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า-เย็น

### ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

### ข้อควรระวัง

- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) และยาต้านเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากคำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง (ที่ไม่สามารถควบคุมความดันได้) โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (ที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้) โรคแผลเปื่อยเพปติก และโรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นตำรับยารสร้อน
- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ
- ควรระวังการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของตับ ไต เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได้

ผู้สั่งใช้ (นพ.คณาวุฒิ นิธิกุล และแพทย์แผนไทย) .....

การประเมินผล (เภสัชกร)

- ตามเกณฑ์       ไม่ตามเกณฑ์