

แบบประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสม (DUE) โรงพยาบาลควนเนียง
ยาแก้ลมแก้เส้น

ผู้ป่วยชื่อ _____ อายุ _____
HN _____ วันที่ส่งจ่าย _____

ข้อบ่งชี้ (ขอความร่วมมือ : ระบุข้อบ่งชี้ทุกครั้ง)

- แก้ลมในเส้น
 บรรเทาอาการมือเท้าชา อ่อนแรง

รูปแบบยา: ผงยา

ขนาดและวิธีใช้: รับประทานครั้งละ 2 กรัม (1 ซอง) วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร เข้า-เย็น

น้ำกระสายยาที่ใช้: น้ำผึ้งรวง หรือน้ำส้มซ่า หรือน้ำต้มสุก

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ผู้ที่มีไข้ และผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

ข้อควรระวัง

- ควรระวังการรับประทานร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) และยาต้านเกล็ดเลือด (antiplatelets)
- ควรระวังการใช้ร่วมกับยา phenytoin, propranolol, theophylline และ rifampicin เนื่องจากคำรับนี้มีพริกไทยในปริมาณสูง
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคแผลเปื่อยเพปติก และโรคกรดไหลย้อน เนื่องจากเป็นตำรับยาร้อน
- ควรระวังการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุ

ผู้สั่งใช้ (นพ.คณาวุฒิ นิธิกุล และแพทย์แผนไทย)

การประเมินผล (เภสัชกร)

- ตามเกณฑ์ ไม่ตามเกณฑ์