

## แบบประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสม (DUE) โรงพยาบาลควบคุมเนียง

### AZITHROMYCIN susp. 200 mg/5 ml (บัญชี ๑)

ผู้ป่วยชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_  
HN \_\_\_\_\_ วันที่สั่งยา \_\_\_\_\_

ข้อบ่งชี้ใช้ (ขอความร่วมมือ : ระบุข้อบ่งใช้ทุกครั้ง)

เพื่อรักษาและป้องกันการติดเชื้อ Pertussis

#### ขนาดยา

- อายุ < 6 เดือน : 10 mg/kg/day OD x 5 day
- อายุ ≥ 6 เดือน : 10 mg/kg/day OD on day 1 then 5 mg/kg/day (max 500 mg) on day 2-5

#### Contraindication

- Cholestatic jaundice or Hepatic dysfunction with prior azithromycin therapy
- Hypersensitivity to azithromycin or to any product component, erythromycin, or any macrolide or ketolide

**Common ADR :** Abdominal pain, Flatulence, Nausea, Vomiting Increased liver enzymes (less than 1% to 6%), Headache, Abnormal vision

**Serious ADR :** Prolonged QT interval, Torsades de pointes, Hypersensitivity reaction, Congenital hypertrophic pyloric stenosis, Hepatic necrosis, Hepatitis, Liver failure, Musculoskeletal: Eaton-Lambert syndrome, Myasthenia gravis, Exacerbation of Myasthenic crisis, Corneal erosion (less than 1%)

แพทย์ผู้สั่งใช้ .....

การประเมินผล (เกรดชกร)

ตามเกณฑ์       ไม่ตามเกณฑ์