

แบบประเมินการใช้ยาอย่างเหมาะสม (DUE) โรงพยาบาลควนเนียง

Pulmicort® Respules 1 mg in 2 ml (บัญญัติยา ก)

ผู้ป่วยชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_  
HN \_\_\_\_\_ วันที่ส่งจ่าย \_\_\_\_\_

ข้อบ่งชี้ใช้ (ขอความร่วมมือ : ระบุข้อบ่งชี้ทุกครั้ง)

- ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยโรคหืด มีอาการกำเริบรุนแรง severe case ที่มีอาการดังต่อไปนี้  
หายใจลำบาก พูดเป็นคำ ๆ กระสับกระส่าย มีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นจากปกติ มากกว่า 10-20 ครั้ง/นาที มีการใช้กล้ามเนื้อหายใจ ได้ยินเสียง wheeze ดังทั้งหายใจเข้าและออก หรือ SpO2 < 95%
- Croup ระดับความรุนแรงปานกลางขึ้นไป
- ได้รับการปรึกษากุมารแพทย์

ประกอบด้วย: Budesonide Inhalation Suspension 1 mg/2 ml

วิธีการบริหาร

- น้ำหนัก <10 kg: Ventolin sol 0.3 ml + Budesonide neb 1 ml + NSS up to 4 ml NB (ซ้่าได้ทุก 20 นาที ให้ได้ถึง 3 ครั้ง)
- น้ำหนัก ≥ 10 kg: Ventolin sol 0.5 ml + Budesonide neb 2 ml + NSS up to 4 ml NB (ซ้่าได้ทุก 20 นาที ให้ได้ถึง 3 ครั้ง)

การแบ่งขนาดยา

หลังผสม NSS ควรใช้ภายใน 30 นาที ควรเก็บหลอดบรรจุยาที่เปิดแล้วภายในซองกันแสง และควรใช้ให้หมดภายใน 12 ชั่วโมง

ข้อห้ามใช้: ผู้ที่แพ้ Budesonide หรือส่วนประกอบใด ๆ ของยานี้

อาการไม่พึงประสงค์

- อาการที่พบบ่อย: ระคายเคืองในลำคอเล็กน้อย ไอ เสียงแหบ ติดเชื้อ Candida ในช่องปากและลำคอ  
Hoarseness
- อาการที่พบได้ยาก: ประสาทไว ภาวะวุ่นวาย เสร้าซึม พฤติกรรมแปรปรวน ลมพิษ ผื่นแดง ผิวหนังอักเสบ  
หลอดลมหดเกร็ง anaphylactic reaction

แพทย์ผู้สั่งใช้.....

การประเมินผล (เภสัชกร)

- ตามเกณฑ์       ไม่ตามเกณฑ์