



## ขนาดยาวัคซีนโรคตามช่วงน้ำหนัก

น้ำหนักก่อนเริ่ม การรักษา (กก.)	ขนาดของยา (มก.)				
	H 4-6 มก./กก./วัน)	R 8-12 มก./กก./วัน)	Z 20-30 มก./กก./วัน)	E 15-20 มก./กก./วัน)	S (มก.)
***35-49	300	450	1000	800	(15 มก./กก./วัน)
50-69	300	600	1500	1000	
>70	300	600	2000	1200	

### หมายเหตุ

- ตารางแสดงช่วงน้ำหนักเพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน แนะนำให้คำนวณน้ำหนักจริงทุกครั้ง ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามขนาดยาที่มีอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการหักเม็ดยา
- ถ้ามีการลดหรือเพิ่มของน้ำหนักตัวในช่วงน้ำหนักที่ต่างกันให้ปรับขนาดยาตามช่วงน้ำหนักที่เปลี่ยนไป เพื่อป้องกันการดี้อยา หรืออาจเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
- น้ำหนักตัวน้อยกว่าหรือเท่ากับ 35 กิโลกรัม ให้คำนวณตามน้ำหนักตัว