



แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลควนเนียง

1. Uncomplicated hypertension




**Metoprolol สามารถพิจารณาใช้ได้ทุก step หากมีข้อบ่งชี้ เช่น HF, Angina, Post-MI, AF หรือหญิงที่วางแผนการตั้งครรภ์/กำลังตั้งครรภ์


2. Hypertension and Coronary artery disease



**สามารถเริ่มการรักษาที่ step นี้ได้ เมื่อ SBP \geq 130 mmHg ในผู้ป่วย very high risk established CVD




3. Hypertension and Chronic Kidney disease



**Metoprolol สามารถพิจารณาให้ได้ทุก step หากมีข้อบ่งชี้ เช่น HF, Angina, Post-MI, AF หรือหญิงที่วางแผนการตั้งครรภ์/กำลังตั้งครรภ์

4. Hypertension and Heart failure with reduced ejection fraction



5. Hypertension and Atrial fibrillation

Step 1
(Dual therapy)

Step 2
(Triple therapy)

Enalapril/Losartan + Metoprolol หรือ

Metoprolol + Amlodipine



Enalapril/Losartan + Metoprolol + Amlodipine/HCTZ หรือ

Metoprolol + Amlodipine + HCTZ

6. Hypertension in Pregnancy

- Hydralazine 25-50 mg วันละ 3 ครั้ง